

## СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 1 от 12 января 2024 года

Адрес: 344029, Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 15а, офис 11 E-mail: monitoringro@yandex.ru

Исх. № 2-06 от 12.01.2024

### Мышевидные грызуны



Отдел по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области сообщает, что образование снежного покрова на сельхозугодьях не препятствует вредоносной деятельности и размножению мышевидных грызунов. Руководителям хозяйств области необходимо организовать мониторинг численности, обследовать посевы озимых культур и многолетних трав, лесополосы, пастбищные и залежные участки. При превышении ЭПВ необходимо незамедлительно приступить к обработке сельхозугодий родентицидами. В начале повторного заселения обработанных площадей эффективно проведение краевых обработок, захватывающих прилегающие к посевам лесные полосы, обочины, участки пастбищ и залежей.

**Для предотвращения гибели диких птиц и животных строго соблюдать правила внесения родентицидов — не превышать нормы внесения, не использовать рассев на поверхности почвы тех препаратов, для которых он не разрешён, обращать внимание на использование следующих препаратов В УКАЗАННЫХ НОРМАХ:**

Родентициды, требующие приманочного продукта: Антимышин, ГР; Килрат Супер, ГР; Курант, ГР; Изоцин БФК, МК; Дедмайс, ГР; Раттикум, Концентрат; Бром-БД, Концентрат. Перед применением препарат необходимо смешать с приманочным продуктом (зерно пшеницы, лущёный овёс, кубики моркови, картофеля, сахарной свёклы, яблока) в соотношении **20 мл** препарата на **1 кг** приманки. Расход смеси — до **4 кг/га, 10 г/нору** (кроме Бром-БД — до **2 кг/га, 5 г/нору**).

**Раттикум и Бром-БД разрешено применять только на культурах защищённого грунта и в помещениях различного назначения!**

**Готовые родентициды:** Варат, Г (до 2 кг/га, 5 г/нору); Клерат, Г (до 3 кг/га, 5 г (1 брикет) на нору); Бродифакум Гранд, Г (до 4 кг/га, 10 г/нору); Килмайс, ТБ (до 4 кг/га, 5 г (1 брикет) на нору); Морторат, Г (до 2 кг/га, 5 г/нору); Варат, ТБ (до 2 кг/га, 3,6 г (1 брикет) на нору); Варат, МБ (до 2 кг/га, 13 г (1 брикет) на 2 норы); Норат, Г (до 2 кг/га, 5 г/нору); Раттидион, Г (до 2 кг/га, 5 г/нору).

**В личных подсобных хозяйствах разрешено применять: Варат, ТБ; Норат, Г; Раттидион, Г.**

Химические родентициды вносятся аппликаторами в норы грызунов на угодьях, либо в приманочные ящики в лесополосах, зернохранилищах, на складах, в помещениях различного назначения. Требуется, чтобы они находились в условиях, исключающих поедание нецелевыми организмами, как до, так и после внесения!

### **Важно!**

**Применять только препараты, включённые в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации»! ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать нормы внесения, регламентированные «Каталогом»! Применение пестицидов проводить только после обследования сельскохозяйственных угодий! Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности! Несоблюдение перечисленных требований является НАРУШЕНИЕМ Федерального закона от 19.07.1997 № 109–ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и влечёт за собой административную и УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!**

**По вопросам проведения обследований, обработок, консультаций обращайтесь в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области**

**Контакты — тел: 8 (863) 251– 57–71, 8 (863) 210–42–27**